

Nombre:	MARIA ELENA
Apellido:	BORJA ORELLANA
Otros Autores:	ROCIO MARTIN, FERNANDO SALINAS, IGNACIO ROS
E-mail:	maelboor@gmail.com
Hospital:	HOSPITAL GENERAL BASICO DE BAZA
Ciudad:	BAZA(GRANADA)
Título:	ESCLEROSIS PERITONEAL ENCAPSULANTE
Presentación:	Presentamos un paciente con ERC estadio 5 en tratamiento con diálisis peritoneal ,DM2 y cirrosis enólica con HTP que acude a consulta de nefrología con dolor abdominal, vómitos e hiporexia . El paciente ha presentado varios episodios de peritonitis anteriormente . Se realiza TAC abdominal ante la sospecha clínica de EPE Y/O obstrucción intestinal
Discusión :	<p>La esclerosis peritoneal encapsulante es una enfermedad rara cuya incidencia va del 0.7 al 3.3 % con una mortalidad del 25 al 50 %. Los factores de riesgo son múltiples siendo el de mayor peso la diálisis peritoneal.</p> <p>Presenta cuatro estadios. En el primero se observa hemoperitoneo, ascitis y calcificaciones peritoneales. En el segundo hiporexia, diarrea e incremento de la PCR. En el estadio 3, dolor abdominal, vómitos y estreñimiento y en el cuatro, obstrucción intestinal y masa abdominal .</p> <p>Se considera a la TAC ABDOMINAL como una prueba con el 100% de sensibilidad y el 94% de especificidad cuando se observan tres de los siguientes signos, engrosamiento o /y calcificación peritoneal, engrosamiento parietal e inmovilización de las asas intestinales , loculación y dilatación de las asas intestinales.</p>
Conclusión:	Le EPE es una enfermedad rara pero debemos plantearnos el diagnóstico por imagen ante la sospecha clínica en pacientes en diálisis peritoneal, ya que el TAC es la mejor prueba de imagen para confirmar su diagnóstico.
Bibliografía:	<p>1. Peritonitis esclerosante encapsulante asociada a la diálisis peritoneal. Una revisión y una iniciativa unitaria europea para abordar el cuidado de una enfermedad rara. Erika de Sousa, Gloria del Peso-Gilsanz, M. Auxiliadora Bajo-Rubio, Marta Osorio-Gonzalez, Rafael Selgas Gutierrez. Nefrología (Madr)2012;32:707-14.</p> <p>2. Situación actual y futuro de la esclerosis peritoneal encapsulante . Erika de Sousa Amorim. MADialisis, Madrid febrero de 2014</p>
Pie de foto:	Loculaciones peritoneales con ascitis y asas intestinales